

**14. Übungsblatt zur Numerik stationärer Differentialgleichungen**

**Aufgabe 38:** Betrachten Sie das Eigenwertproblem

$$\begin{aligned} -u''(x) &= \lambda u(x) && \text{in } (0, \pi), \\ u(0) &= u(\pi) = 0. \end{aligned}$$

Zur Diskretisierung werden lineare Finite Elemente mit einer äquidistanten Unterteilung von  $[0, \pi]$  in  $(N + 1)$  Teilintervalle der Länge  $h$  gewählt.

- (a) Geben Sie die Matrizen  $A$  und  $M$  des zugehörigen Systems  $A\mu = \lambda M\mu$  an.
- (b) Die kontinuierlichen Eigenwerte und -vektoren lauten

$$\lambda_m = m^2, \quad u_m(x) = \sin(mx), \quad m = 1, 2, \dots$$

Die diskreten Eigenwerte und -vektoren sind gegeben durch

$$\lambda_{m,h} = \frac{6}{h^2} \frac{1 - \cos mh}{2 + \cos mh}, \quad u_{m,h} = \Pi_h u_m, \quad m = 1, 2, \dots, N.$$

Dabei bezeichnet  $\Pi_h v = \sum_{n=1}^N v(nh)\varphi_n$  die stückweise lineare Interpolation in den Gitterpunkten mit der Finite Elemente-Basis  $(\varphi_n)_{n=1}^N$ . Verifizieren Sie dies und zeigen Sie die Abschätzung

$$\lambda_m - \lambda_{m,h} \leq C(m)h^2.$$

**Aufgabe 39:** Seien  $\Omega_1 \subset \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$  zwei Gebiete mit zugehörigen Dirichlet-Problemen

$$\begin{aligned} -\Delta u &= \lambda u && \text{in } \Omega_i, \\ u &= 0 && \text{auf } \partial\Omega_i, \end{aligned}$$

mit Eigenwerten  $\lambda_m(\Omega_i)$ ,  $i = 1, 2$ ,  $m = 1, 2, \dots$ . Zeigen Sie:

$$\lambda_m(\Omega_1) \geq \lambda_m(\Omega_2).$$

**Aufgabe 40:** Betrachten Sie das Anfangs-/Randwertproblem der Wärmeleitungsgleichung

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} u - \Delta u &= 0 && \text{in } \Omega \times (0, T), \\ u &= 0 && \text{auf } \Omega \times (0, T), \\ u &= u_0 && \text{für } t = 0 \end{aligned}$$

mit  $u_0 : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ . Zeigen Sie:

- (a) Falls eine klassische Lösung  $u : \bar{\Omega} \times [0, T]$  existiert, so ist diese gegeben durch

$$u(\cdot, t) = \sum_{m=1}^{\infty} (u_0, w_m) e^{-\lambda_m t} w_m,$$

wobei  $\lambda_m$  und  $w_m$  die Eigenwerte bzw.  $L_2(\Omega)$ -orthonormalen Eigenvektoren des Laplace-Operators sind.

Hinweis: Machen Sie den Ansatz  $u(x, t) = \varphi(t)w(x)$ .

(b) Folgern Sie für bel.  $k \in \mathbb{N}$ :

$$\left\| \frac{\partial^k}{\partial t^k} u(\cdot, t) \right\|_0 \leq C(t, k) \|u_0\|_0.$$

Was geschieht im Falle  $t \rightarrow \infty$ ?

(c) Schlagen Sie numerische Verfahren zur Lösung dieses Problems vor.

Hinweis: Die Bearbeitung von Aufgabenteil (c) kann durch den Besuch der Vorlesung über die Numerik instationärer Differentialgleichungen im Sommersemester 2014 ersetzt werden.

**Besprechung in der Übung am 03.02.2014.**

Ansprechpartner: Bernd Brumm,

brumm@na.uni-tuebingen.de, Sprechstunde Fr 13 - 17 nach Anmeldung