Universität Tübingen
Mathematisches Institut
Prof. Dr. Christian Lubich

Tübingen, 4. November 2026

3. Übungsblatt zur Numerik

Aufgabe 9: Bestimmen Sie das Interpolationspolynom $p(x)$ zweiten Grades einer Funktion f zu den Daten

x_j	t	$t+h/2$	$t+h$
y_j	$f(t)$	$f(t+h/2)$	$f(t+h)$

$t \in \mathbb{R},\ h > 0.$

Zeigen Sie weiter: Integriert man dieses Polynom von t bis $t+h$, so erhält man die Simpsonregel.

Aufgabe 10: Gegeben sei die Wertetabelle

x_i	-1	0	1	3
y_i	8	3	4	8

.

(a) Man interpoliere die Wertetabelle nach der Interpolationsformel von Newton.

(b) Es seien $(x_4, y_4) = (2, 1)$. Wie lautet das Newtonsche Interpolationspolynom unter Hinzunahme des Punktes (x_4, y_4)?

(c) Man bestimme mit der Interpolationsformel von Lagrange das eindeutig bestimmte Polynom dritten Grades durch die obigen Wertepaare.

(d) Vergleichen Sie den Aufwand der Auswertung des Interpolationspolynoms an einer Stelle $\bar{x}$ in der Newtonschen und der Lagrangeschen Darstellung.

Aufgabe 11: Gegeben sei das Interpolationspolynom $p(x)$ von $f(x)$ zu den Stützstellen $x_0, x_0 + \varepsilon, x_0 + 2\varepsilon, \ldots, x_0 + n\varepsilon$, wobei f $(n+1)$-mal stetig differenzierbar sei.

(a) Zeigen Sie, dass $p(x)$ für $\varepsilon \to 0$ gegen das n-te Taylorpolynom von $f(x)$ in x_0 konvergiert.

(b) Bestimmen Sie die Form des Interpolationsfehlers $f(x) - p(x)$ für $\varepsilon \to 0$.

Aufgabe 12: Zeigen Sie, dass für ein Polynom p vom Grad n eine brauchbare und leicht zu berechnende Schätzung von $\max_{x\in[-1,1]} |p(x)|$ durch $\max_{k=0,\ldots,n} |p(x_k)|$ gegeben ist, falls x_k die Nullstellen des Tschebyscheff-Polynoms T_{n+1} sind: Finden Sie eine möglichst kleine Konstante C_n, so dass

$$\max_{x\in[-1,1]} |p(x)| \le C_n \cdot \max_{k=0,\ldots,n} |p(x_k)|$$

Programmieraufgabe 2: (Adaptive Numerische Integration)

Schreiben Sie eine Funktion `adaptint(f,a,b,tol)`, die für Intervallgrenzen a und b und eine vorgegebene Toleranz `tol` das Integral

$$\int_a^b f(x)dx$$

mit Hilfe der Simpsonregel berechnet, wobei der absolute Fehler kleiner als `tol` sein soll. Durch den rekursiven Aufruf von `adaptint` soll das Grundintervall adaptiv zerlegt werden. Zur Schätzung des Fehlers verwenden Sie die Mittelpunktsregel.

Schreiben Sie ein Skript `adaptint_test`, indem Sie eine Approximation von

$$\int_0^4 x^2 \mathrm{e}^{-5x} \mathrm{d}x$$

berechnen.

Hinweis: Die Funktion `adaptint(f,a,b,tol)` berechnet Näherungen von $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ mithilfe der Simpson- und der Mittelpunktsregel. Falls $|Simpson - Mittelpunkt| > tol$ wird das Intervall $[a, b]$ halbiert und als Ergebnis `adaptint(f,`$a, (a+b)/2$`,tol/2)` + `adaptint(f,`$(a+b)/2, b$`,tol/2)` zurückgegeben, ansonsten wird als Ergebnis *Simpson* akzeptiert. Die Funktion ruft sich im ersten Fall also selbst auf (rekursiv).

Besprechung der Übungsaufgaben am 11. November 2026.
Abgabe der Programmieraufgabe bis 17. November 2026, 23:59 Uhr
an `https://na.uni-tuebingen.de/ex/num1_ws2627/`.